

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  
ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ

ТЕСТ РЕТЕНЦИЈЕ ЗНАЊА: В07 - ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА У ПРАКСИ  
24. 11. 2011. године

1. Систем расподеле индивидуалне терапије (СРИТ) је систем дистрибуције лекова у болници који подразумева расподелу:
  - а) јединичних доза пацијентима на одељењу
  - б) дневних доза лека пацијентима на одељењу
  - в) целокупне терапије пацијентима на одељењу
2. „Сигнатура“ је део рецепта који садржи:
  - а) упутство о томе како пацијент да користи лек
  - б) назив лека и облик паковања
  - в) количину и облик лека
3. Подаци из требовања треба јасно да дефинишу:
  - а) шта се тражи - назив и количину лека
  - б) за коју организациону јединицу је наручено
  - в) како ће се лек применити
4. Којим се од следећих начина примене лекова остварује најбрже деловање лека:
  - а) с.ц.
  - б) и.м.
  - в) и.в.
5. Ознаке на рецепту : “cito”, “statim”, “periculum in mora” означавају:
  - а) хитно издавање лека
  - б) да се лек изда у руке лекару
  - в) да је лек за примену у стационарној установи
6. Лек ПРВОГ ИЗБОРА код трудница са благом до умереном хипертензијом у трудноћи је:
  - а) нитроглицерин
  - б) фуросемид
  - в) еналаприл
  - г) метилдопа
7. Препорука фармацеута везана за трицикличне антидепресиве је да их никада не треба примењивати са:
  - а) алкохолом
  - б) хипотензивним лековима
  - в) хипертензивним лековима
  - г) инхибиторима МАО
8. Који од наведених кортикостероида се примењује путем инхалације?
  - а) преднизолон
  - б) метилпреднизолон
  - в) беклометазон
  - г) сви одговори су тачни.
9. Примена кортикостероида је контраиндикована код:
  - а) анафилактичког шока
  - б) бронхијалне астме
  - в) пептичког улкуса
  - г) урођене хиперплазије надбубрега
10. Који од следећих лекова припада групи лекова за лечење хиперлипемije:
  - а) трамадол
  - б) целесохиб
  - в) ловастатин
  - г) ципротерон

11. Инсулин зависни дијабетес се лечи применом инсулина. Међу наведеним препаратима инсулина, заокружити онај који је погодан за интравенску примену у хитним стањима:
- а) инсулин лиспро
  - б) природни "кристални" инсулин
  - в) протамин цинк инсулин
  - г) инсулин ленте
12. Антидот за предозирање хепарина је:
- а) стрептокиназа
  - б) аценокумарол
  - в) протамин-сулфат
  - г) тромбин
13. Који од наведених оралних хипогликемика је најпогоднији за примену код гојазних пацијената и оних пацијената код којих је хипергликемија резултат неосетљивости на инсулин?
- а) метформин
  - б) росиглитазон
  - в) акарбоза
  - г) глибенкламид
14. Најтеже нежељено дејство клиндамицина је појава:
- а) псеудомембранозног колитиса
  - б) гастритиса
  - в) ентеритиса
  - г) циститиса
15. Примена којих, од следећих лекова је контраиндикована код пацијената који болују од бронхијалне астме:
- а) квинаприл
  - б) нифедипин
  - в) пропранолол
  - г) дигоксин
16. Означи интернационално незаштићено име лека ("генеричко име")
- а) виагра
  - б) фуросемид
  - в) нифелат
  - г) зоркаптил
17. Синдром сиве бебе може изазвати:
- а) ампицилин
  - б) цефотаксим
  - в) хлорамфеникол
  - г) еритромицин
18. Тригоник је лек који:
- а) ремети срчани ритам
  - б) има склоност ка изазивању алергија
  - в) омета психомоторну координацију
  - г) не сме се узимати за време јела
19. Означи лек за који је дозвољена набавка и без рецепта:
- а) амитриптилин
  - б) сертралин
  - в) нафазолин
  - г) халоперидол
20. Истовремена примена статина и деривата фибричне киселине:
- а) повећава ризик од рабдомиолизе
  - б) смањује ризик од рабдомиолизе
  - в) доводи до хемијског хепатитиса
  - г) доводи до цирозе јетре