

ЛЕЧЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ ОД АЛКОХОЛА

ДИСУЛФИРАМ

- ⌘ Иреверзибилни инхибитор алдехид-дехидрогеназе
- ⌘ Доза је 250мг/дан, годину дана

ДИСУЛФИРАМ

⌘ Контраиндикован је код:

- ⦿ цирозе јетре са портном хипертензијом
- ⦿ трудноће (тератоген је)
- ⦿ епилепсије
- ⦿ психоорганичног синдрома

⌘ Нежељена дејства:

- ⦿ хепатитис (после 2 месеца)

НАЛТРЕКСОН

- ⌘ Компетитивни антагониста опиоида
- ⌘ Слаби пријатан ефекат алкохола који иначе ослобађа ендогене опиоиде
- ⌘ Доза је 50мг/дан (у првој недељи 25мг/дан), током 12 недеља

НАЛТРЕКСОН

⌘ Контраиндикације:

- ⊙ обољења јетре

⌘ Нежељена дејства:

- ⊙ мучнина

- ⊙ у већим дозама ($>200\text{мг/дан}$)
повећава ензиме јетре

АКАМПРОСАТ

(Са-ацетил-хомотауринат)

- ⌘ Инхибира НМДА рецепторе (парцијални агонист)
- ⌘ Доза: 2 капсуле са 333мг лека на 8 сати, током 6-12 месеци

АКАМПРОСАТ

- ⌘ Добро се апсорбује, али му храна омета апсорпцију
- ⌘ Не метаболише се, излучује се неизмењен преко бубрега
- ⌘ Може се применити код циротичара

АКАМПРОСАТ

⌘ Контраиндикације:

- ⊙ трудноћа

⌘ Нежељена дејства:

- ⊙ едем на ногама
- ⊙ гастроинтестиналне тегобе
- ⊙ конфузија, поспаност, промене либида

НОВА ТЕРАПИЈА:

ТОПИРАМАТ + ОНДАНСЕТРОН