

КОМА КОД ТРОВАЊА

ОТРОВИ КОЈИ ИЗАЗИВАЈУ КОМУ

Хипнотици и седативи

Алкохоли

Растварачи

Керозин

Антихистаминици

Атропин

Антипсихотици

Опиоиди

ОТРОВИ КОЈИ ИЗАЗИВАЈУ КОМУ

- | Хипогликемијски лекови

- | Гама бутиролактон

- | Гама хидроксибутират

- | Салицилати

- | Со

- | Цијаниди

- | Дигиталис

- | Инсектициди или родентициди

ОТРОВИ КОЈИ ИЗАЗИВАЈУ КОМУ

- | Катјонски детерџенти

- | As, Hg, Pb

- | Фенол

- | Борна киселина

- | Нафталин

- | Мелатонин

- | Тиса (*taxus baccata*)

- | Кукута (*cicuta maculata*)

ЛЕЧЕЊЕ КОМЕ

Не примењивати лекове који стимулишу мозак у лечењу коме

Проходност дисајних путева

Одговарајућа вентилација

Циркулација

Пацијент се мора опсервирати све до нормализације свести

Праћење виталних параметара и стања свести

Аускултација плућа и аспирација секрета

Катетеризација мокраћне бешике и мерење диурезе

Постављање интравенског катетера за примену лекова

50мл 50% раствора глукозе (деци 2мл/кг 25% глукозе)

Избегавати претерану примену течности због развоја едема мозга

На 30' окретати пацијента, масирати му
кожу и аспирирати дисајне путеве

Адекватна хидрација

На време препознати инфекцију и
применити антибиотике

Ако кома траје > 48h , ентерална или
парентерална исхрана

После интубације урадити лаважу
желуца са активним угљем

Хемодијализа код дијализибилних
отрова