

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

**MEDICINSKI FAKULTET**

**TESTOVI SA ODGOVORIMA IZ VEŠTINE  
KOMUNIKACIJE**

**Kragujevac, 2008. godine**

## Pitanja iz veštine komunikacije

1. Odnos bolesnika prema bolesti može biti:
  - a. aktivno-sarađujući
  - b. kapitulirajući
  - c. izbegavajući
  - d. sve navedeno
  
2. Kada se pacijent pridržava saveta i preporuka zdravstvenih radnika i ima želju za izlečenjem njegov odnos prema bolesti je:
  - a. kapitulirajući
  - b. aktivno-sarađujući
  - c. izbegavajući
  - d. odbacujući
  
3. Bolesnik koji ne želi da se suoči sa svojom bolešću i negira je ispoljava prema bolesti:
  - a. aktivno-sarađujući odnos
  - b. kapitulirajući odnos
  - c. izbegavajući odnos
  - d. transferni odnos
  
4. Predavanje bolesti uz gubitak želje za izlečenjem predstavlja odnos prema bolesti koji je:
  - a. aktivno-sarađujući
  - b. pasivni
  - c. izbegavajući
  - d. kapitulirajući
  
5. Zdravstveni radnici prema bolesniku ispoljavaju psihološki odnos:
  - a. empatije
  - b. antipatije
  - c. simpatije
  - d. apatije
  
6. Empatski odnos zdravstvenih radnika prema bolesniku podrazumeva:
  - a. sažaljenje
  - b. saosećajnost
  - c. netrpeljivost
  - d. ljubav

7. Poremećaji na psihološkom planu koji se javljaju usled somatske bolesti nazivaju se:
  - a. psihosomatski
  - b. psihijatrijski
  - c. somatopsihički
  - d. psihosocijalni
  
8. Eutanazija je:
  - a. samoubistvo
  - b. ubistvo iz milosrđa
  - c. ubistvo sa predumišljajem
  - d. pokušaj samoubistva
  
9. Postulat *Pia fraus*-dobronamerna laž podrazumeva:
  - a. laganje bolesnika u pogledu dijagnoze i prognoze bolesti
  - b. davanje potpunih informacija o bolesti
  - c. laganje kolega
  - d. pogrešna dijagnoza
  
10. Zbog značaja koje oko kao organ ima, prilikom povrede oka najčešće se kao reakcija javlja:
  - a. radost
  - b. mržnja
  - c. bes
  - d. panični strah
  
11. Psihološki problemi kod obolelih od srčanih oboljenja najčešće se javljaju kao posledica:
  - a. straha od smrti
  - b. straha od lekova
  - c. nemogućnosti željene ishrane
  - d. redukcije radne efikasnosti
  
12. Umanjenje seksualne aktivnosti kod obolelih od infarkta miokarda utiče na:
  - a. profesionalni angažman
  - b. umanjenje kvaliteta života
  - c. prevremeno penzionisanje
  - d. efikasnije dejstvo lekova
  
13. Poremećaji govora (govorne mane) mogu dovesti kod bolesnika do osećanja:
  - a. ljubomore
  - b. straha
  - c. inferiornosti
  - d. radosti
  
14. Oboljenja kože (naročito lica) dovode do psiholoških poremećaja usled osećanja:
  - a. straha od injekcija
  - b. straha od smrti
  - c. radosti
  - d. estetske naruženosti

15. Oštećenja lokomotornog sistema (urođena ili stečena) usled hendikepiranosti mogu dovesti do reakcija:
- depresije
  - anksioznosti
  - agresivnosti
  - sve navedeno
16. Oboljenja urogenitalnog sistema, zbog intimnog značaja za čoveka, mogu izazvati kod pacijenata:
- estetske smetnje
  - seksualne konflikte
  - interpersonalne konflikte
  - psihosomatske poremećaje
17. Strah od komunikacije i kontakta sa hendikepiranim licima se javlja usled:
- sopstvene narcističke povrede
  - nehumanosti
  - regresije
  - izolacije
18. Osećanje izolacije, otuđenja, usamljenosti i okrenutosti ka samom sebi najbolje se prevazilazi:
- lekovima
  - fizikalnom terapijom
  - banjskim lečenjem
  - grupnom terapijom
19. Na razvoj ličnosti utiče socijalno okruženje:
- da
  - ne
20. Ličnost je formirana na rođenju:
- da
  - ne
21. Za osobu karakterističan način ponašanja i mišljenja određen je njenom \_\_\_\_\_ .
22. Za razvoj ličnosti značajni su \_\_\_\_\_ i socijalni činioci.
23. Relativno opšte i relativno trajne osobine ličnosti predstavljaju \_\_\_\_\_ ličnosti.
24. Razvoj ličnosti je:
- statičan proces
  - neprekidan proces
  - neprikladan proces
  - statistički proces

25. Neki događaji (smrt bliske osobe, teška bolest, gubitak posla) mogu dovesti do značajnih promena ličnosti:
- da
  - ne
26. Prilikom razvoja ličnosti može doći i do regresije (nazadovanja):
- da
  - ne
27. Kod ekscentričnih osoba struktura ličnosti je:
- oplemenjena
  - povećana
  - poremećena
  - oslabljena
28. Osobe sa hendikepom najčešće razvijaju osećanje \_\_\_\_\_ .
29. Adekvatan odnos roditelja prema deci sa fizičkim hendikepom podrazumeva:
- preteranu zaštitu
  - zanemarivanje
  - prenaglašena ljubav
  - ni jedno od navedenih
30. Traumatski invalidizirane osobe moraju biti pored medicinske rehabilitacije podvrgnute:
- psihičkoj rehabilitaciji
  - dijeti
  - stalnom nadzoru
  - izolaciji
31. Osobe sa maladaptivnim crtama ličnosti se uklapaju u socijalno okruženje:
- otežano
  - olakšano
  - brzo
  - javno
32. Narušeno zdravlje utiče na:
- poboljšanje kvaliteta života
  - smanjenje kvaliteta života
  - otpor prema lekovima
  - povećanje efikasnosti
33. Na kvalitet stresne reakcije utiče psihološka organizacija ličnosti:
- da
  - ne
34. Pored verbalne postoji i \_\_\_\_\_ komunikacija.

35. Kada osoba oboli od somatske bolesti kod nje dolazi do poremećaja i na psihološkom i na socijalnom planu:
- da
  - ne
36. Posmatranje čoveka kao bio-psiho-socijalno biće predstavlja:
- filozofski pristup
  - sociološki pristup
  - holistički pristup
  - religiozni pristup
37. Gestikulacije, izraz lica, pokreti tela sa određenom porukom predstavljaju:
- verbalnu komunikaciju
  - neverbalnu komunikaciju
  - epileptičke napade
  - nevoljne pokrete
38. Govor prepun mržnje i omalovažavanja nekoga predstavlja komunikaciju koja je:
- neverbalna
  - konstruktivna
  - destruktivna
  - socijalno prihvatljiva
39. Komunikacija koja se odvija između dve osobe koje ravnopravno učestvuju u njoj je:
- destruktivna
  - jednosmerna
  - dvosmerna
  - monološka
40. Stigmatizacija određenih kategorija bolesnika (psihijatrijskih, hendikepiranih, zaraznih) je karakteristika primitivnih i nehumanih osoba:
- da
  - ne
41. Osoba koja se destruktivno ponaša prema društvenoj zajednici i njenim članovima predstavlja:
- humanu osobu
  - razvratnika
  - antisocijalnu ličnost
  - borca za političke ideje
42. U procesima socijalizacije individue vodeću ulogu ima:
- televizija
  - internet
  - porodica
  - štampa

43. Alternativni metodi lečenja mogu biti prihvatljivi ukoliko su zasnovani na:
- crnoj magiji
  - religiji
  - horoskopu
  - naučnim činjenicama i priznati od strane medicinskih stručnjaka
44. Dobijanje podataka o bolesti razgovorom sa pacijentom i njegovim okruženjem postiže se:
- Anamnezom
  - Amniocentezom
  - Analizom
  - Sintezom
45. Iz kog jezika ima poreklo reč anamneza:
- grčkog
  - arapskog
  - turskog
  - latinskog
46. Reč anamneza znači:
- podatak
  - sećanje
  - istina
  - znanje
47. Osoba povučena u sebe je:
- labilna
  - intravert
  - ekstravert
  - euforična
48. Otvorene i komunikativne osobe su:
- pasionirane
  - disforične
  - ekstraverti
  - intraverti
49. Uobičajen stručni termin za posmatranje u medicini je:
- status
  - anamneza
  - inspekcija
  - palpacija
50. Po savremenim shvatanjima prenos stavova i osećanja obolele osobe na zdravstvenog radnika je:
- transfer
  - kontratransfer
  - simpatija
  - empatija

51. Empatija u transfernoj relaciji podrazumeva:
- razumevanje osećanja, mišljenja i aktivnosti pacijenta
  - simpatije prema pacijentu
  - otpore i antipatije u odnosu na sagovornika
52. Izražajni pokreti lica su:
- portret
  - izraz
  - mimika
  - lepota
53. Reč mimika od mimios je porekla:
- arapskog
  - latinskog
  - grčkog
  - francuskog
54. Sekundarno slaboumlje je:
- mentalna retardacija
  - oligofrenija
  - demencija
  - delirijum
55. Dementne osobe su nekada imale razvijenu inteligenciju:
- da
  - ne
56. Izraz lica dementnih osoba je dugo sačuvan:
- da
  - ne
57. Dva osnovna kvaliteta emocija su \_\_\_\_\_ i raspoloženje.
58. Relativno ravnomerno stanje osećanja je \_\_\_\_\_ .
59. Afekti su praćeni spolja vidljivim \_\_\_\_\_ senzacijama.
60. Postavljanje pitanja je značajna odlika dece od druge do sedme godine života:
- da
  - ne
61. Preadolescentni period života karakteriše:
- intenziviranje seksualnog nagona
  - opsednutost telesnim promenama
  - pojačanje narcizma
  - sve navedeno



62. Komunikacija sa pacijentom pripadnikom nacionalne manjine otežana je usled:
- kulturoloških razlika
  - boje kože
  - stariosnih razlika
63. Komunikacija pacijenta koji je pogođen moždanim udarom može biti otežana zbog:
- strabizma
  - agnozije
  - afazije
64. Sumračno stanje je fenomen koji se može javiti kod:
- Parkinsonizma
  - epilepsije
  - distrofije
65. Porodici umirućeg bolesnika treba:
- dati prave i tačne informacije
  - davati lažnu nadu
  - treba sugerisati alternativne nemedicinske tretmane
66. Pacijentu obolelom od AIDS- a treba:
- prećutati od koje bolesti boluje
  - savetovati alternativne metode lečenja
  - uputiti ga u specijalizovanu ustanovu za lečenje
67. Pacijenta treba pre hirurške intervencije:
- pripremiti na samo izvođenje hirurške intervencije
  - pripremiti na moguće ishode
  - dati mu da potpiše saglasnost
  - svi odgovori su tačni
68. Za sprovođenje kliničkih studija potrebno je:
- dogovoriti se sa pacijentom oko sprovođenja protokola
  - uključiti pacijentu lek po izboru lekara
  - dobiti pisani informisani pristanak pacijenta
69. Pacijenti sa hipetireozom mogu imati:
- dezorijentaciju
  - sumanute ideje
  - anksioznost
70. Pacijent sa akutnim infarktom miokarda je:
- uznemiren
  - apatičan
  - u stuporu